

OISEAUX

des Forêts Sèches de Nouvelle-Calédonie

Guide d'identification



Frédéric Desmoulins, Nicolas Barré

NOUVELLE
2010
EDITION

Fauvette à ventre jaune, Wapipi**Gérygone mélanésienne**, Fan-tailed Gerygone

Sous espèce endémique


**Identification**

10 cm

Passereau de très petite taille. Dimorphisme sexuel peu marqué. Aspect fin. Bec fin et noir. Dos, ailes, queue, calotte gris olive assez clair. Extrémité de la queue blanche (visible au vol). Gorge, joues et plastron gris clair. Ventre et flancs jaune clair souvent estompé et peu visible sur le terrain. Sourcil blanc. Femelle et jeune ont le plumage moins contrasté, jaune moins apparent.

Oiseau batailleur et très territorial se déplaçant en couple. Souvent

observé se poursuivant au dessus des frondaisons. Chasse aussi les insectes en vol, le claquement du bec est facilement entendu.

**Voix**

Chant très répétitif constitué de notes flûtées et douces montantes et descendantes en ritournelle.

Ne pas confondre avec


Peut être confondue avec les femelles et les jeunes de Sucrier écarlate (*Myzomèle calédonien*). Le bec de ces derniers plus long et incurvé permet toutefois de les différencier dans de bonnes conditions d'observation. Le bout de la queue blanc et le chant doux et répétitif sont aussi de bons critères de diagnose. Le comportement alimentaire est aussi discriminant.

Statut, habitat, comportement

Un des oiseaux les plus communs. Affectionne les milieux ouverts comme les milieux forestiers, toutefois plus abondant en lisières. N'occupe pas ou peu les forêts les plus denses. Présent dans 67,1 % des points et 95 % des massifs de forêts sèches.

Reproduction

Période de reproduction de septembre à janvier. Deux ou trois œufs blanchâtres mouchetés de beige, sont pondus dans un nid en boule allongé fait de fibres végétales, accroché à moins de trois mètres du sol à des rameaux. L'entrée est située sur la partie haute du nid et est protégée par une sorte d'auvent. L'intérieur est garni de plumes et de duvet. Il est orné dans sa partie basse d'une queue. Un seul des adultes conduit l'incubation jusqu'à l'éclosion. Les deux parents élèvent les jeunes.



Régime alimentaire

Insectivore : se nourrit de petits insectes capturés dans le feuillage et les rameaux des arbres et buissons qu'il prospecte.



Photo N. Barré

Nid en poche. (Photo V. Chartendault)





Petit oiseau fin. (photo N. Barré)



photo F. Desmoulin

Rossignol, Rossignol à ventre jaune**Miro à ventre jaune, Yellow-bellied Robin**


Espèce endémique

**Identification**

14-15 cm

Passereau de petite taille au ventre jaune. Aspect rond. Tête relativement grosse. Pas de dimorphisme sexuel. Plumage gris sur le dos, le dessus de la tête, les ailes et la queue. Ventre jaune, gorge blanche, plastron gris clair. Immature brun moucheté de plumes plus claires sur le dos et les couvertures des ailes, ventre jaune pâle.

Oiseau peu farouche. S'approche curieusement de l'observateur. Evolue dans la partie moyenne et basse de la frondaison. Se déplace également au sol à la recherche de nourriture. Au crépuscule, à l'aube et parfois la nuit, il se perche au sommet d'un arbre et chante puissamment.

**Voix**

Chant puissant, mélodieux, très varié. Cris de gorge, ritournelles et cris répétitifs constituent la vaste gamme de vocalises de cet oiseau, ce qui lui a valu son nom local.

Ne pas confondre avec

Ne peut pas être confondu visuellement. Certains de ses cris répétitifs peuvent être pris pour des cris d'Emouchet bleu (Autour à ventre blanc). Oiseau familier, dans le sous-bois.

Statut, habitat, comportement

Cette espèce affectionne les massifs forestiers, paraforestiers, forêts humides, forêts galeries et les formations secondarisées à Gaïac. Sa répartition limitée aux forêts sclérophylles situées au nord de Moindou (hormis les îles de Balabio et Baaba) ainsi que son absence des autres massifs plus septentrionaux reste inexplicée. C'est une des espèces indicatrices de

la forêt sclérophylle bien conservée. On la trouve aussi dans les massifs secondarisés à Gaïac et Gardenia adjacents. Présent dans 9,7 % des points et 32 % des massifs de forêts sèches.


Reproduction

Période de nidification de septembre à février. Le nid en coupe est finement exécuté à l'aide de matière végétale fibreuse, de fragments d'écorce et de fils d'araignée. Deux œufs beiges abondamment mouchetés de brun sont pondus. Les deux adultes conduisent la couvaison et l'élevage des jeunes.

Régime alimentaire

Insectivore : se nourrit d'insectes capturés au sol, sur les troncs et branches basses du sous-bois. Ne dédaigne pas les reliefs de pique-niques (Parc de la Rivière Bleue).



Les petites taches claires sur les ailes identifient le juvénile. (photo N. Barré)



Adulte. (photo F. Desmoulins)

Sourd**Siffleur calédonien**, New caledonian Whistler

Espèce endémique

**Identification**

15 cm

Passereau de petite taille. Dimorphisme sexuel marqué. Mâle : dessus de la tête gris foncé, gorge blanche, collier noir. Dos, ailes, queue verdâtre sombre. Ventre, flancs et sous caudales jaune cury. Femelle dos, ailes, queue, dessus de la tête brun gris. Ventre et sous caudales marron clair uni. Gorge blanc gris. Immature ressemble à la femelle.


Espèce strictement forestière généralement en couple. Souvent observée en compagnie du Grand Lève-queue (*Rhipidure tacheté*).

Voix


Chant mélodieux, flûté, composé de sifflements. Le mâle a un sifflement caractéristique composé de deux notes puissantes "ouitt-chou" peu variées qui permettent de le différencier du chant du Sourd à ventre roux (Siffleur itchong), plus élaboré et plus diversifié.

Ne pas confondre avec

Peut être confondu avec le Sourd à ventre roux, mais la couleur du ventre des mâles des deux espèces les différencie. Le collier du Sourd à ventre roux est moins marqué et la femelle de ce dernier est beige striée de brun. Le chant du Sourd (Siffleur calédonien) est peu varié avec notamment les strophes sur deux notes répétées de nombreuses fois.




Mâle



Femelle

Statut, habitat, comportement

Oiseau assez commun, strictement forestier. Fréquente les forêts humides, les maquis paraforestiers et les forêts sclérophylles denses où il est toutefois peu commun. C'est une espèce de milieux forestiers bien conservés et une des espèces indicatrices des belles forêts sclérophylles. Absente des formations buissonnantes secondarisées. Présente dans 12,6 % des points et 59 % des massifs de forêts sèches.



Reproduction

Reproduction de septembre à janvier. Le nid en coupe est constitué d'un fin tressage de brindilles fixé aux branches par du fil d'araignée. La ponte est de deux œufs blancs tachetés de noir. Le couple conduit l'incubation et l'élevage des jeunes.

Régime alimentaire

Insectivore : se nourrit d'insectes qu'il capture dans les frondaisons et la partie moyenne et basse de la végétation, parfois au sol.



Mâle.
(photo F. Desmoulins)



Femelle.
(photo F. Desmoulins)

Sourd à ventre roux, Sourd**Siffleur itchong**, Rufous Whistler

Sous espèce endémique

**Identification**

15-16 cm

Passereau de petite taille. Dimorphisme sexuel marqué. Aspect élancé. Mâle : calotte, dos, ailes, sus caudales et queue gris. Ventre et sous caudales roux. Collier assez discontinu noir. Gorge blanche. Bec noir. La femelle est moins contrastée que le mâle. Calotte, dos, sus caudales, queue beige. Ventre et sous caudales fauve clair finement striés de noir. Gorge plus claire. L'immatrice ressemble à la femelle.

Oiseau de milieux ouverts. Facilement observable car il est commun, prospecte activement les fourrés à la recherche de sa nourriture et émet de nombreuses vocalises. Les femelles, moins farouches que les mâles s'approchent fréquemment de l'observateur.

Voix

Chant sifflé composé de nombreuses strophes variées. Se termine souvent par la même note puissante répétée et appuyée.

Ne pas confondre avec


Peut être confondu avec le Sourd (Siffleur calédonien). Ce dernier a toutefois le ventre plus jaune, le collier plus marqué et est dans l'ensemble plus contrasté. Son chant est moins varié.

Statut, habitat, comportement

C'est un oiseau commun des milieux ouverts : bocages, zones cultivées, jardins de brousse et de villages. Fréquente les forêts sclérophylles dans leurs parties les moins denses. Très



Mâle



Femelle